

ヒブ・肺炎球菌 接種スケジュール

標準的な接種開始月齢は生後2か月から6か月の間です
 できるだけこの月齢で接種開始するようにしましょう

《ヒブワクチン》

接種開始月齢 **生後2か月～7か月** に至るまで（接種回数4回）

4～8週あけて 4～8週あけて 3回目接種後7～13月の間

1回目 → 2回目 → 3回目 → 追加

★医師が必要と認めた場合は、3週目から接種できます。
 ★2回目、3回目の接種は1歳までに接種することとなっています。
2回目・3回目の接種をする際、1歳を過ぎている場合は、接種回数に変更になります。
 間違って接種しますと、公費ではなくなります（全額実費になります）ので必ず、ご連絡ください。

接種開始月齢 **生後7か月～1歳** に至るまで（接種回数3回）

4～8週あけて 2回目接種後7～13月の間

1回目 → 2回目 → 追加

★2回目の接種は1歳までに接種することとなっています。
2回目の接種をする際、1歳を過ぎている場合は、2回目の接種はできません。

接種開始年齢 **1歳～5歳** に至るまで（接種回数1回）

1回目

《肺炎球菌ワクチン》

接種開始月齢 **生後2か月～7か月** に至るまで（接種回数4回）

27日以上 27日以上 60日以上あけて 生後12月以降

1回目 → 2回目 → 3回目 → 追加

★2回目、3回目の接種は2歳までに接種することとなっています。
ただし、2回目の接種が1歳を過ぎた場合は、3回目の接種は公費ではできません。
 ★追加接種は、標準として生後12～15か月の間に受けましょう。

接種開始月齢 **生後7か月～1未満**（接種回数3回）

27日以上 60日以上あけて 生後12月以降

1回目 → 2回目 → 追加

★2回目の接種は2歳までに接種することとなっています。

接種開始年齢 **1歳～2歳未満**（接種回数2回）

60日以上あけて

1回目 → 追加

接種開始年齢 **2歳～5歳未満**（接種回数1回）

1回目