

【乳幼児】

予防接種の種類		回数	標準的な接種期間	予防接種法で定められた年齢
ヒブ (Hib) 感染症	初 回	3	生後2か月～7か月 接種翌日から数えて、28日目から57日目までに 次回接種	生後2か月～5歳に至るまで
	追 加	1	初回3回目接種終了後7か月～13か月の間隔を おいて接種	
小児用肺炎球菌感染症	初 回	3	生後2か月～7か月 27日以上の間隔をおいて次回接種	生後2か月～5歳に至るまで
	追 加	1	初回3回目終了後60日以上の間隔をおき かつ1歳を過ぎてから接種	
B型肝炎		3	生後2か月～9か月 1回目接種翌日から27日以上あけて2回目接種 1回目接種翌日から139日以上あけて3回目接種	生後1歳に至るまで
BCG		1	生後5か月～8か月	生後1歳に至るまで
四種混合 (ジフテリア 百日咳 破傷風 不活化ポリオ)	1期初回	3	生後3か月～12月 接種翌日から数えて、21日目から57日目までに 次回接種	生後3か月～7歳6か月に 至るまで
	1期追加	1	1期初回3回目接種終了後12月～18月おいて 接種	
麻しん風しん混合 (MR)	1期	1	生後1歳を過ぎて早めに	生後1歳～2歳に至るまで
	2期	1	小学校に入学する前の1年間 (年長児)	
水 痘	1回目	1	生後12か月～15か月	生後1歳～3歳に至るまで
	2回目	1	1回目接種終了後6か月～12か月おいて接種	
日本脳炎	1期初回	2	3歳 接種翌日から数えて、7日目から29日目までに 次回接種	生後6か月～7歳6か月に 至るまで
	1期追加	1	4歳 (初回2回目終了後概ね1年後)	

【児童・生徒】

予防接種の種類		回数	標準的な接種期間	予防接種法で定められた年齢
日本脳炎	2期	1	9歳～10歳	9歳～13歳未満
二種混合 (ジフテリア・破傷 風)	2期	1	11歳～12歳	11歳～13歳未満
ヒトパピローマウイルス (子宮頸がん感染症)	3	中学1年生		小学6年生～高校1年生
		<2価ワクチン> 1回目 → 2回目 (1回目接種の1月後に接種) → 3回目 (1回目接種の6月以上に接種)		
		<4価ワクチン> 1回目 → 2回目 (1回目接種の2月後に接種) → 3回目 (1回目接種の6月以上に接種)		